Avril 2011

Liste et statut des espèces de Reptiles de France métropolitaine y compris la Corse

37 espèces en France métropolitaine, Corse y compris (plus 5 espèces de tortues marines qui fréquentent plus ou moins les cotes).

REPTILES DE FRANCE METROPOLITAINE (Corse y compris)

Espèce	Nom latin	Zone couverte en France	Liste rouge nationale (UICN)	Directive Habitats	Convention de Berne
Tortue d'Hermann	*Testudo hermanni*	Massif des Maures et ses abords immédiats (Var) et en Corse (plaine orientale et sud de l'île)	**VU** **EN (pop. Var)**	**II et IV**	**II**
(Tortue grecque)	*Testudo graeca*	Introduite accidentellement par endroits ? présence d'individus isolés. Pas de population.			
Cistude d'Europe	*Emys orbicularis*	Populations fragmentées dans le Centre, l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, Rhône Alpes (surtout nord Isère), littoral méditerranéen (plaine des Maures, Camargue) et Corse.	**NT**	**II et IV**	**II**
Tortue de Floride	*Trachemys scripta*	Partout en France. Introduite.	**NA *Introduite***		
Emyde lepreuse	*Mauremys leprosa*	Limite septentrionale en France dans le Roussillon (P.O.). Elle n'occupe plus que quelques ruisseaux du massif des Albères. Des individus isolés sont observés dans le Gard, l'Hérault et l'Aude.	**EN**	**II et IV**	**III**
Orvet fragile	*Anguis fragilis*	Il occupe presque tout le pays ; absent de Corse	**L.C.**		**III**
Seps strié	*Chalcides striatus*	Présent dans tout le Midi, atteignant au nord le sud de la Drôme et de l'Ardèche (Aubenas) et Sisteron dans la vallée de la Durance. A l'ouest, il est connu de plusieurs stations apparemment isolées dans l'ouest de la France (Ariège, Haute Garonne, Gers, Landes et Charente-Maritime).	**L.C.**		**III**

Phyllodactyle d'Europe	*Euleptes europaeus*	îles de Marseille, îles des Embiez, îles d'Hyères, Corse et îlots périphériques ainsi que les Alpes Maritime.	**N.T.** **VU (population provençale)**	**II et IV**	**II**
Hémidactyle verruqueux	*Hemidactylus turcicus*	Pop. naturelles : massif des Albères (Pyrénées-Orientales), région marseillaise (Bouches-du-Rhône), îles d'Hyères (Var), région de Menton (Alpes-Maritimes) et quelques parties basses de la Corse. Présent dans diverses agglomérations : Agde, Nîmes, Marseille, Gonfaron, Hyères.	**N.T.**		**III**
Tarente commune	*Tarentola mauritanica*	La répartition naturelle semble se limiter, dans notre pays, à la Corse, à la Provence méditerranéenne, depuis la frontière italienne jusqu'aux environs de Marseille (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône), et aux basses altitudes des Pyrénées-Orientales. Introduite dans certaines villes (Toulouse, Bordeaux, Marmande, Villeneuve sur Lot….)	**L.C.**		**III**
Algyroïde de Fitzinger	*Algyroides fitzingeri*	Corse (quasi-totalité de l'île) et Sardaigne (endémique de ces deux îles). Pas connu en Corse au dessus de 1400 m.	**L.C.**	**IV**	**II**
Psammodrome d'Espagne	*Psammodromus hispanicus*	Zones méditerranéennes les plus chaudes, depuis le bord de mer jusqu'à plus de 1000 mètres en certains points de Provence. Remonte jusque dans le sud de la Drôme et le sud de l'Ardèche. Pas de populations sur les îles.	**N.T.**		**III**
Psammodrome algire	*Psammodromus algirus*	Parties méditerranéennes des départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et d'une partie du Gard. Absent à l'Est du Rhône.	**L.C.**		**III**
Lézard ocellé	*Timon lepidus*	Tous les départements de Provence et du Languedoc-Roussillon. Le long de la vallée du Rhône jusqu'aux environs de Valence, et vers le nord-ouest, jusque sur les causses du Lot, la Dordogne et le sud de la Charente-Maritime. Sur la façade atlantique, sur l'île d'Oléron en limite nord de distribution et vers le sud jusqu'à Tarnos. Absent de Corse.	**VU**		**II**

Lézard vert	*Lacerta bilineata*	Il occupe les trois quarts méridionaux de la France. Absent de Corse.	**L.C.**	**IV**	**II**
Lézard des souches	*Lacerta agilis*	les deux tiers est et nord-est du pays, à l'intérieur d'une ligne qui relie les départements des Ardennes, de l'est de l'Eure, de la Sarthe, de la Haute-Vienne, du nord de la Lozère et de l'Ardèche, de la Haute-Savoie, du Jura et du Bas-Rhin. A l'extérieur de ce périmètre, il existe quelques populations isolées : hautes altitudes du nord des Alpes-Maritimes et du nord-est des Alpes-de-Haute-Provence (arc alpin).	**L.C.**	**IV**	**II**
Lézard des souches ssp. garzoni	*Lacerta agilis ssp garzoni*	Pyrénées-Orientales.	**EN.**		
Lézard vivipare	*Zootoca vivipara*	Tiers nord du pays, chaîne du Jura, moitié nord des Alpes, Massif central, Pyrénées, Landes et Gironde.	**L.C.**		**III**
Lézard sicilien	*Podarcis sicula*	Toutes les populations françaises ont été introduites par l'Homme	**L.C.**	**IV**	**II**
Lézard thyrrénien	*Podarcis tiliguerta*	Endémique de Corse et de Sardaigne	**L.C.**	**IV**	**II**
Lézard de Bedriaga	*Archaeolacerta bedriagae*	Endémique à la Corse et à la Sardaigne.	**N.T.**	**IV**	**II**
Lézard des murailles	*Podarcis muralis*	Presque toute la France	**L.C.**	**IV**	**II**
Lézard catalan	*Podarcis liolepis*	Tout le Languedoc-Roussillon, dans la partie caussenarde du département de l'Aveyron et une grande partie de l'Ardèche. Observé également en Drôme et Vaucluse. Il atteint l'extrême sud du département du Tarn et certains coteaux ensoleillés de l'Ariège et de la Haute-Garonne. Il remonte au nord-est jusque sur les contreforts du massif du Pilat, en Haute-Loire, qui marquent la limite septentrionale et orientale de sa vaste distribution géographique. On le retrouve ensuite beaucoup plus à l'ouest, dans une petite partie du Pays basque, près des zones frontalières avec l'Espagne. Atteint 1630 m dans l'est des Pyrénées.	**L.C.**		**III**

Lézard de Bonnal	*Iberolacerta bonnali*	Endémique de la chaîne des Pyrénées, et plus précisément de sa partie centrale, depuis le Pic du Midi d'Ossau à l'ouest, jusqu'au Port de Venasque à l'est. Il est donc présent dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne sur une distance d'environ 100 kilomètres. De 1500 à 3140 m d'altitude.	**EN**		
Lézard du Val d'Aran	*Iberolacerta aranica*	Endémique d'une petite portion des Pyrénées, placée entre la répartition d'*I. aurelioi* (à l'est) et celle d'*I. bonnali* (à l'ouest). Entre 2000 et 2750 m d'altitude.	**EN.**	**Non reconnu**	**Non reconnu**
Lézard d'Aurelio	*Iberolacerta aurelioi*	Endémique aux Pyrénées, sur les pentes de haute altitude du massif de Montroig (versant espagnol) et du Pic d'Estat, à cheval sur l'Espagne, Andorre et le département de l'Ariège. Au dessus de 2000 m.	**CR.**	**Non reconnu**	**Non reconnu**
Couleuvre de Montpellier	*Malpolon monspessulanus*	Inféodée au climat méditerranéen. Région méditerranéenne du Midi, remontant au nord la vallée du Rhône jusqu'aux environs de Valence, suivant en cela la répartition du Chêne vert (*Quercus ilex*), jusqu'à plus de 1000 m d'altitude dans les Pyrénées-Orientales. Absente de Corse.	**L.C.**		**III**
Coronelle lisse	*Coronella austriaca*	Une grande partie du pays. Elle semble manquer dans l'extrême nord du pays et est absente dans la plaine aquitaine et dans tout le Midi méditerranéen, ainsi qu'en Corse. 1400 m d'altitude dans le Massif central, 2140 m dans les Pyrénées,	**L.C.**	**IV**	**II**
Coronelle girondine	*Coronella girondica*	Tout le Midi de la France, elle remonte la vallée du Rhône jusqu'aux environs de Vienne et dans l'Isère jusque vers Grenoble. De manière sporadique dans l'Aquitaine, sur les Grands Causses situés à l'ouest du Massif central (Gramat, Périgord) et le long de la façade atlantique. Limite nord de distribution à l'île d'Oléron. Atteint 1200 m d'altitude.	**L.C.**		**III**

Couleuvre verte et jaune	*Hierophis viridiflavus*	Les deux tiers méridionaux du pays et la Corse, et remonta au nord-est jusque dans le département des Ardennes. 1460 m dans les Alpes, 1800 m dans les Pyrénées. Absente d'une partie de la région méditerranéenne où elle est remplacée par la couleuvre de Montpellier.	**L.C.**	**IV**	**II**
Couleuvre à échelons	*Rhinechis scalaris*	Zone méditerranéenne de basse altitude. Elle remonte au nord jusqu'au milieu des départements de l'Ardèche et de la Drôme. A l'ouest, sa répartition s'étend jusqu'à Carcassonne (Aude). Elle est présente sur les îles d'Hyères mais absente de Corse.	**L.C.**		**III**
Couleuvre d'Esculape	*Zamenis longissimus*	Dans les deux tiers méridionaux du pays, avec cependant d'importantes lacunes. 1400 m dans les Alpes. Absente de Corse et des îles du littoral provençal	**L.C.**	**IV**	**II**
Couleuvre à collier	*Natrix natrix*	Serpent le plus répandu en France. 2000 m dans les Alpes.	**L.C.**		**III**
Couleuvre à collier corse	*Natrix natrix ssp. corsa*	Corse	**N.T.**		
Couleuvre vipérine	*Natrix maura*	Espèce méridionale, qui occupe la plupart des zones humides de basse et moyenne altitude des deux tiers méridionaux de la France.1700 m dans les Pyrénées, 1000 m dans les Alpes. Limite nord de répartition du sud de la Bretagne, au nord des Pays de la Loire, sud de la région parisienne, Bourgogne et Franche-Comté (départements du Doubs et du Jura). Absente de Corse.	**L.C.**		**III**

Vipère aspic	*Vipera aspis*	les deux tiers sud du pays, au sud d'une ligne joignant le sud-est de la Bretagne, Paris, Nancy et le massif du Jura. Présente plus au nord dans quelques stations des Ardennes, de Lorraine, des Vosges et d'Alsace. Elle évite la plaine méditerranéenne mais elle s'approche tout près du littoral de la Méditerranée à la faveur de collines rocheuses bien garnies en éboulis, avec un couvert forestier relativement dense (Albères dans les Pyrénées-Orientales, montagne de la Mourre près de Montpellier, massif du Lubéron, Alpes-Maritimes). Absente de Corse comme toutes les autres vipères.	**L.C.**		**III**
Vipère d'Orsini	*Vipera ursinii*	Quelques stations distribuées dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et du Vaucluse, et situées entre 900 m et 2100 m d'altitude.	**CR.**	**II et IV**	**II**
Vipère péliade	*Vipera berus*	La Vipère péliade présente une aire de répartition fragmentée limitée aux parties les plus humides du pays : Massif central au-dessus de 900 m d'altitude (au sud jusqu'au mont Lozère), chaîne du Jura, quelques stations en Lorraine, puis une zone plus vaste qui s'étend de la Bretagne au Pas-de-Calais et aux Ardennes. Elle est au bord de l'extinction dans plusieurs régions, en particulier dans les Vosges. Elle a disparu du sud des Alpes	**L.C.**	**IV**	**III**
Vipère de Seoanne	*Vipera seoanei*	Elle pénètre en France par le Pays basque dans une petite région frontalière avec l'Espagne, au sud d'une ligne Bayonne–Cambo (Pyrénées-Atlantiques), qui n'excède guère 100 km2 : le long de la côte atlantique jusqu'à St-Jean-de-Luz ; forêt de Sare, à l'est de la Rhune ; haute vallée des Aldudes. Entre 0 et 900 m d'altitude.	**N.T.**	**IV**	**III**

Les tortues marines

Espèce	Nom latin	Liste rouge nationale UICN
Tortue luth	*Dermochelys coriacea*	**D.D.**
Tortue caouanne	*Caretta caretta*	**D.D.**
Tortue verte	*Chelonia mydas*	**N.A.b**
Tortue caret	*Eretmochelys imbricata*	**N.A.b**
Tortue de Kemp	*Lepidochelys kempii*	**N.A.b**

Sur les 37 espèces de reptiles terrestres présentes en France, 5 espèces sont sur l'Annexe II de la Directive Habitats (*Testudo hermanni, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Euleptes europaeus, Vipera ursinii*) et 12 espèces à l'Annexe IV de la Directive Habitats.

La liste rouge nationale basée sur les critères UICN et publiée en 2008 fait ressortir :

- **7 espèces (et une sous espèce) dans les trois catégories : CR : en danger critique d'extinction ou EN : en danger ou VU : vulnérable**
- **6 espèces (et une sous espèce) dans la catégorie N.T : quasi menacée.**

A noter également la distinction dans les critères de menace en fonction de populations : exemple des populations de tortue d'Hermann et de celles du phyllodactyle d'Europe.

Rappel des critères UICN (signification des abréviations)

CR	**Espèce en danger critique d'extinction**
EN	**Espèce en danger**
VU	**Espèce vulnérable**
N.T.	**Espèce proche du niveau de menace (quasi menacée)**
L.C.	**Espèce à considération mineure**
D.D.	**Espèce dont les données sont insuffisantes**
NA a	**Espèce non évaluée car introduite dans la période récente**
NA b	**Espèce non évaluée car présente de manière occasionnelle en France**

Note : cette liste a été réalisée pour le stage « gestion conservatoire des populations de reptiles et d'amphibiens en milieux bocagers » organisé en avril 2011. Elle prend en compte la liste rouge nationale UICN publiée en 2008. La répartition reprend en grande partie les informations connues dans le CD sur les reptiles et les amphibiens de France, Philippe Geniez & Marc Cheylan, (éditions EducAgri) et dans le livre de Vacher & Geniez : les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, collection Parthénope, 2010.